

Vaccinatieschema voor pups en volwassen honden



Iedere dierenartsenpraktijk werkt met een vaccinatieschema.
Hieronder vindt u het advies vaccinatieschema van MSD Animal Health
voor pups en volwassen honden.

Advies basisvaccinatieschema pup

Leeftijd	Vaccineren tegen		
6-7 weken	Hondenziekte + Parvo		
8-9 weken	Leptospirose	Parvo	Besmettelijke hondenhoest
12-13 weken**	Leptospirose	Hondenziekte + Leverziekte* + Parvo	
6-12 maanden***	Leptospirose	Hondenziekte + Leverziekte* + Parvo	Besmettelijke hondenhoest
• Rabiësvaccinatie vanaf 12 weken.			

Advies jaarlijks vaccinatieschema volwassen hond

Leeftijd	Vaccineren tegen		
2 ^e levensjaar	Leptospirose		Besmettelijke hondenhoest
3 ^e levensjaar	Leptospirose		Besmettelijke hondenhoest
4 ^e levensjaar	Leptospirose	Hondenziekte + Leverziekte* + Parvo	Besmettelijke hondenhoest
5 ^e levensjaar	Leptospirose		Besmettelijke hondenhoest
6 ^e levensjaar	Leptospirose		Besmettelijke hondenhoest
7 ^e levensjaar	Leptospirose	Hondenziekte + Leverziekte* + Parvo	Besmettelijke hondenhoest
8 ^e levensjaar	Leptospirose		Besmettelijke hondenhoest
• Rabiësvaccinatie (indien nodig) om de 3 jaar herhalen.			

*Besmettelijke leverziekte veroorzaakt door canine adenovirus type 2.

**Pupvaccinatie niet afronden vóór de leeftijd van 12 weken.

***De basisvaccinatie is pas afgerond met een "cocktailvaccinatie" op de leeftijd tussen de 6 en 12 maanden. Het belangrijkste doel van deze vaccinatie is het verkrijgen van een beschermende immuunrespons die langdurig aanhoudt. Dit is namelijk niet altijd het geval bij pups na afronding van de pupvaccinatie. Zeker voor pups zonder vlekkeloze start (bijv. pups uit het buitenland, pups die ziek zijn geweest tijdens hun eerste levensmaanden) is het advies om de basisvaccinatie te vervroegen en op 6 maanden leeftijd af te ronden. Let op: dit is dus geen extra vaccinatie.