



## Polyoma

### Wat is Polyoma?

Polyoma is een zeer dodelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het Aviaire Polyoma Virus (APV) en voornamelijk grasparkieten en andere papegaaiachtigen aantast. De ziekte wordt bij grasparkieten ook wel BFD, Budgerigar Fledgling Disease, ofwel kruipersziekte genoemd. De verschijnselen bij grasparkieten zijn anders dan bij grotere papegaaiensoorten.

### Symptomen

De ziekte komt vooral voor bij papegaaien jonger dan 6 maanden en verloopt heel snel. Verschijnselen die kunnen optreden zijn braken, diarree, verminderde of afwezige eetlust, vermageren, het krijgen van onderhuidse bloedingen, het ontwikkelen van een dikke (met vocht gevulde) buik, verlamingsverschijnselen van de poot/poten en trillingen/schudbewegingen van de kop en het lichaam. Sterfte treedt helaas binnen enkele dagen op, soms zonder dat de vogel verschijnselen vertoond heeft.

Bij grasparkieten komen twee vormen van de ziekte voor, de acute vorm die lijkt op de hierboven beschreven vorm, en een chronische vorm. Bij deze chronische vorm worden de veren aangetast waardoor de vogel niet meer kan vliegen en gaat kruipen ("kruipersziekte"). Dit wordt vooral gezien bij pas gespeende vogels.

### Onderzoek

De diagnose wordt gesteld via een bloedonderzoek of het nemen van een monster van het slijmvlies van de cloaca van de vogel.

### Behandeling

Helaas is er geen genezende behandeling voor Polyoma. De behandeling van vogels met Polyoma is ondersteunend gericht op het aanpakken van eventuele secundaire infecties. Helaas overlijden de meeste vogels ondanks de behandeling. Sommige vogels (met name de oudere) herstellen van de ziekte en kunnen dan symptoom loze drager worden. Dit betekent dat ze het virus met zich mee dragen en uitscheiden, zonder hier zelf ziek van te zijn.

### Lopen mijn andere vogels gevaar?

Verspreiding van het Polyomavirus vindt meestal plaats via direct contact met een zieke vogel of met diens ontlasting of verenstof. Een ouderdier kan het virus aan zijn jong doorgeven. Belangrijk is om te voorkomen dat de ziekte zich verspreid door contact met een besmette vogel. Verspreiding kan ook indirect plaatsvinden, via de handen, kleding of materialen. Het is daarom belangrijk om goede hygiënemaatregelen te nemen, zoals het desinfecteren van nestboxen, kooien en gebruikte materialen met bleek.

Voor vragen over het huisvesten met andere vogels kunt het beste contact opnemen met de kliniek.

### Is het gevaarlijk voor mijzelf?

Polyoma is niet gevaarlijk voor mensen.

